



# بروس ١٩فاك®

لقاح مجفد معلق للحقن

لقاح حي مضغف لبروسيلة الإجهاض المعدني عترة S19

## إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بكتيري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

## معلومات إضافية:

مرض البروسيلة هو مرض بكتيري مشترك بين الإنسان والحيوان ويعتبر واحد من أهم أمراض الحيوانات الناجم عن بكتيريا البروسيلة. وتستند تدابير السيطرة على المرض على النظافة التامة وتحصين الحيوانات المعرضة للإصابة مثل الأبقار والجاموس. يتميز اللقاح بالخصائص التالية:

- الثبات.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو عامة.
- يوفر مناعة كافية لعدة سنوات ضد مرض الإجهاض المعدني.
- يوفر التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

## التعبئة:

زجاجات سعة: ٢ جرعة، ٥ جرعات، ١٠ جرعات.

## الإستخدام البيطري فقط.

- استخدم اللقاح بعد اذابته مباشرة (خلال ساعتين في ظروف باردة)

## فترة السحب:

- اللحم: ٢١ يوم.
- الحليب: ٢١ يوم.

## إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ في التلاجة (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ١٨ شهر من تاريخ الإنتاج.
- صلاحية اللقاح بعد اذابة اللقاح: يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

## تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

- اللقاح يسبب مرض للإنسان لذا يجب الإبتياح من الحقن الخاطئ أو فرك العين أثناء العمل.
- يجب أخذ المشورة الطبية في حالة التعرض العرضي للقاح.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يجب توخي الحذر عند تحصين الحيوانات المرضعة والحوامل.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

عدم إعطاء مضادات حيوية ٧ أيام قبل التحصين.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز العالي من جرعة اللقاح المعتمدة:

نادرة: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة.

إذا لاحظت أي آثار جانبية ، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

## إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccen.com, www.jovaccen.com

## بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على ٥٠ - ١٠٠ × ١٠<sup>٦</sup> CFU من بكتيريا البروسيلة الإجهاض المعدني المضغف المحضّر من عترة S19.
- المكونات الأخرى: تريبنون، سكروز، صوديوم غلوتاميت.

## الإستطبايات:

يعطى لقاح بروس ١٩فاك لتحصين الأبقار والجاموس ضد مرض الإجهاض المعدني.

## مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

## ردود الفعل السلبية:

نادرة جداً: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة. إذا لاحظت أي آثار جانبية ، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

## الأنصاف المستهدفة:

الأبقار والجاموس.

## الجرعة:

احقن إنث عجول الأبقار و الجاموس على عمر ٣-٦ أشهر جرعة واحدة (٣ مل) لكل حيوان تحت الجلد في منطقة تحت الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر.

## طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهرات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح فوراً قبل الإستخدام.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح (٦ مل لكل زجاجة لقاح ٢ جرعة، ١٥ مل لكل زجاجة لقاح ٥ جرعات)، ٣٠ مل لكل زجاجة لقاح ١٠ جرعة).

Jovac