



# Պատվաստանյութեր հղի անձանց համար



Եթե Դուք հղի եք, պատվաստանյութերը կարող են և Ձեզ, և Ձեր երեխային պաշտպանել կանխարգելվող հիվանդություններից: Պատվաստանյութերը սովորեցնում են Ձեր մարմնին ճանաչել վնասակար վիրուսները կամ բակտերիաները և ստեղծել հատուկ հակամարմիններ՝ Ձեզ և Ձեր երեխային առողջ պահելու համար: Երբ հղիության ընթացքում Դուք պատվաստվում եք, Ձեր հակամարմիններից որոշները մինչև ծնունդը փոխանցվում են Ձեր երեխային: Այս հակամարմինները Ձեր երեխայի համար ապահովում են պաշտպանություն ծանր հիվանդություններից կյանքի առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում:

## Դուք պետք է իմանաք՝

- ◆ Պատվաստանյութերը հղիության ընթացքում անվտանգ են հղիների և նրանց երեխաների համար:
- ◆ Հղիության ընթացքում պատվաստվելը լավագույն միջոցն է նորածիններին լուրջ հիվանդություններից պաշտպանելու համար, հատկապես քանի որ նրանք դեռևս չեն կարող պատվաստվել:

## Պատվաստանյութեր, որոնք անհարժեշտ են հղիության ընթացքում

### Փայտացման, դիֆթերիայի, կապույտ հազի (Tdap) դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ Ստացեք Tdap պատվաստանյութը յուրաքանչյուր հղիության 27-36-րդ շաբաթների ընթացքում՝ Ձեր երեխային կապույտ հազից պաշտպանելու համար:
- ◆ Կապույտ հազը հատկապես ծանր է նորածինների մոտ և կարող է կյանքի համար վտանգավոր լինել:

### COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ COVID-19-ի դեմ պատվաստվելը Ձեզ համար անվտանգ է հղիության ցանկացած պահին:
- ◆ Հղիներն ավելի հավանական է, որ ծանր կհիվանդանան COVID-19-ով, քան ոչ հղիները:
- ◆ COVID-19-ի դեմ թարմացված պատվաստանյութ ստանալն ապահովում է Ձեր նորածնի պաշտպանությունը կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում, մինչև որ 6 ամսականում Ձեր երեխան կկարողանա ինքը ստանալ COVID-19-ի դեմ իր պատվաստանյութը:
- ◆ Հղիները պետք է սպասեն առնվազն 2 ամիս COVID-19-ի դեմ ցանկացած պատվաստանյութի վերջին դեղաչափից հետո՝ նախքան COVID-19 դեմ թարմացված պատվաստանյութի դեղաչափ ստանալը:

### Շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) դեմ պատվաստանյութ՝


- ◆ Հղիները սեպտեմբերից մինչև հունվար կարող են ստանալ շնչառական սինցիտիալ վիրուսի դեմ պատվաստանյութի (RSV) մեկ դեղաչափ՝ հղիության 32-36-րդ շաբաթների ընթացքում՝ նորածնին շնչառական սինցիտիալ վիրուսից պաշտպանելու համար: RSV-ին երեխաների մոտ կարող է առաջացնել բրոնխիտ և թոքաբորբ:
- ◆ Նորածինների մոտ RSV-ի ծանր հիվանդությունը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում RSV սեզոնին կամ հղիության ընթացքում մոր պատվաստում RSV պատվաստանյութով, կամ ծնվելուց անմիջապես հետո նորածնի պատվաստում nirsevimab-ով:  
Նորածինների մեծ մասը չի ունենա երկուսի կարիքը:



(Armenian)



# Պատվաստանյութեր հղի անձանց համար



## Գրիպի դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ Գրիպի դեմ պատվաստվելն անվտանգ է հղիության ցանկացած պահին:
- ◆ Յուրաքանչյուր ամսական հավանական է, որ գրիպով ծանր կհիվանդանան:
- ◆ Այլ տարիքային խմբերի երեխաների համեմատ՝ 6 ամսականից փոքր երեխաների համար գրիպի պատճառով հոսպիտալացվելու վտանգն ամենամեծն է:
- ◆ Ժամանակին գրիպի դեմ պատվաստվելը ապահովում է պաշտպանություն Ձեզ համար, ինչպես նաև կյանքի առաջին ամիսներին Ձեր նորածնի համար, մինչև որ Ձեր երեխան կկարողանա ինքը ստանալ գրիպի դեմ իր պատվաստանյութը:

## Ջեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ՝

Յուրաքանչյուր, ովքեր նախկինում չեն պատվաստվել հեպատիտ Բ-ի դեմ, պետք է հղիության ընթացքում ստանան հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ, որպեսզի իրենց և իրենց երեխային պաշտպանեն հեպատիտ Բ վիրուսից առաջացող վարակներից և հիվանդություններից: Ջեպատիտ Բ-ն կարող է երկարատև վնաս պատճառել յարդին:

## Պատվաստանյութեր, որոնք անհրաժեշտ են նորածնին ծննդի պահին

### Ջեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ Ձեր նորածնին պետք է ստանա հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը ծնվելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, որպեսզի պաշտպանվի հեպատիտ Բ-ի վարակից:

### Շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) դեմ ներարկում (Nirsevimab)՝

- ◆ Եթե դուք չեք պատվաստվել շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) դեմ պատվաստանյութով հղիության ընթացքում, կամ եթե Ձեր երեխան ծնվել է RSV-ի դեմ ձեր պատվաստումից հետո 14 օրվա ընթացքում, Ձեր նորածնին պետք է ստանա nirsevimab-ի (Նիրսևիմաբ) մեկ դեղաչափ RSV-ի սեզոնից առաջ կամ դրա ընթացքում, որպեսզի պաշտպանվի ծանր հիվանդանալուց: Շնչառական սինցիտիալ վիրուսը նորածնների շրջանում հոսպիտալացումների ամենատարածված պատճառն է:

Ձեր երեխան կստանա նաև հակաբիոտիկ աչքի կաթիլներ՝ աչքի վարակները կանխելու համար, կարվի վիտամին Կ-ի ներարկում և արյան պարզ թեստ՝ նորածնի ստուգման համար: Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ձեր հղիության խնամքի մատակարարին:



## Հանրային Առողջության զանգերի կենտրոն

Հավելյալ տեղեկությունների համար Հանրային Առողջության զանգերի կենտրոնը հասանելի է **1-833-540-0473** հեռախոսահամարով ամեն օր՝ առավոտյան 8-ից երեկոյան 8-ը՝ շաբաթը յոթ օր: