


疫苗

適用於懷孕人士的資訊



如果您懷孕了，疫苗可以保護您和您的寶寶免受可預防疾病的侵害。疫苗教會您的身體識別有害的病毒或細菌，並製造特殊的抗體，讓您和寶寶保持健康。當您在懷孕期間接種疫苗時，您的一些抗體會在寶寶出生前傳遞給他們。這些抗體為您的寶寶在出生後最初幾個月提供預防嚴重疾病的保護。



以下是您需要了解的訊息：

- 懷孕期間接種疫苗對孕者及胎兒是安全的。
- 懷孕期間接種疫苗是保護新生兒免受嚴重疾病侵害的最佳方法，尤其是因為他們還不能接種疫苗。

懷孕期間需要接種的疫苗

破傷風、白喉、百日咳 (Tdap) 疫苗：

- 在每次懷孕的第 27 至 36 週之間接種 Tdap 疫苗可以幫助您的寶寶免受百日咳的侵害。
- 百日咳對新生兒是特別嚴重的疾病，可能危及生命。

COVID-19 疫苗：

- 在懷孕期間的任何時候都可以安全接種 COVID-19 疫苗。
- 與非孕者相比，懷孕人士更容易罹患 COVID-19 重症。
- 接種最新版 COVID-19 疫苗可以在新生兒出生後的最初幾個月為他們提供保護，直到您的寶寶在 6 個月大時能夠接種自己的 COVID-19 疫苗。
- 懷孕人士應該在上次接種任何 COVID-19 疫苗後等待至少兩個月再接種一劑最新版 COVID-19 疫苗。

呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗：

- 從 9 月份到 1 月份，懷孕人士在懷孕 32 週至 36 週期間可以接種一劑呼吸道融合病毒疫苗，以保護她們的新生兒免於感染 RSV。RSV 會導致年幼嬰兒患上細支氣管炎和肺炎。
- 為了預防嬰兒患上 RSV 重症，建議在 RSV 流行季為懷孕人士接種 RSV 疫苗，或者為出生不久的嬰兒注射 nirsevimab 進行免疫。大多數嬰兒不需要同時使用兩種免疫方法。




(Traditional Chinese)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

疫苗

適用於懷孕人士的資訊



流感疫苗：

- 在懷孕期間的任何時候都可以安全接種流感疫苗。
- 懷孕人士更容易罹患流感重症。
- 與其他年齡段的兒童相比，6 個月以下的嬰兒因流感住院的風險最高。
- 接種最新的流感疫苗可以為您和您的新生兒在出生後的最初幾個月提供保護，直到您的寶寶能夠接種自己的流感疫苗。

B 型肝炎疫苗：

- 以前沒有接種過 B 型肝炎疫苗的懷孕人士應該在懷孕期間接種 B 型肝炎疫苗，以保護自己和嬰兒免於罹患 B 型肝炎病毒造成的感染和疾病。B 型肝炎會對肝臟造成長期損害。

新生兒出生時需要接種的疫苗

B 型肝炎疫苗：

- 您的新生兒應在出生後 24 小時內接種第一劑 B 型肝炎疫苗，以保護他們免於感染 B 型肝炎。

注射預防 RSV 的藥物 (Nirsevimab)：

- 如果您在懷孕期間沒有接種 RSV 疫苗，或者如果您的寶寶在您接種 RSV 疫苗後的 14 天內出生，那麼您的新生兒在 RSV 流行季之前或期間應該注射一劑 nirsevimab，以保護他們免於患上嚴重疾病。RSV 是新生兒住院的最常見原因。

您的寶寶還將接受抗生素滴眼液，注射維生素 K，並接受一次用於新生兒篩查的簡單血液檢查。如果您有任何疑問，請諮詢您的產前保健提供者。



公共衛生局呼叫中心

如需更多資訊，公共衛生局呼叫中心的工作時間為每週七天，上午 8 點至晚上 8 點，電話號碼是 **1-833-540-0473**。