

Интервальные реберные раскраски "лестниц Мебиуса"

П.А. Петросян

Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА,
г. Ереван, ул. П. Севака 1, 375014, Армения, e-mail: pet_petros@yahoo.com

Показано, что "лестницы Мебиуса" интервально окрашиваемы. Найдены все значения t , для которых существует интервальная реберная t -раскраска данных графов.

Пусть $G = (V, E)$ - неориентированный связный граф без кратных ребер и петель [1], $V(G)$ - множество вершин графа G , $E(G)$ - множество ребер графа G . Степень вершины x в G обозначим через $d_G(x)$, максимальную из степеней вершин через $\Delta(G)$, хроматический класс [2] G через $\chi'(G)$. Граф назовем регулярным, если все его вершины имеют одну и ту же степень. Расстояние между вершинами x и y обозначим через $d(x, y)$, а диаметр графа G - через $d(G)$. Если α - правильная раскраска [3] ребер графа G , то цвет ребра $e \in E(G)$ при раскраске α обозначим через $\alpha(e)$.

Интервальной [4] реберной t -раскраской графа G назовем правильную раскраску ребер G в цвета $1, 2, \dots, t$, при которой в каждый цвет i , $1 \leq i \leq t$, окрашено хотя бы одно ребро $e_i \in E(G)$, и ребра, инцидентные каждой вершине $x \in V(G)$, окрашены в $d_G(x)$ последовательных цветов.

Граф G назовем интервально окрашиваемым, если существует $t \geq 1$, для которого G имеет интервальную реберную t -раскраску.

Множество всех интервально окрашиваемых графов обозначим через \mathfrak{N} [5].

Для $G \in \mathfrak{N}$ обозначим через $w(G)$ и $W(G)$, соответственно, наименьшее и наибольшее t , для которого G имеет интервальную реберную t -раскраску.

В [6] доказано, что задача распознавания: $G \in \mathfrak{N}$ или $G \notin \mathfrak{N}$, является NP -полней [7,8] для двудольных графов G .

Теорема 1 [9]. Если G - двудольный граф и $G \in \mathfrak{N}$, то

$$W(G) \leq d(G)(\Delta(G) - 1) + 1.$$

Теорема 2 [9]. Если G содержит цикл нечетной длины и $G \in \mathfrak{N}$, то

$$W(G) \leq (d(G) + 1)(\Delta(G) - 1) + 1.$$

В [5] доказана

Теорема 3. Пусть G - регулярный граф.

(1) $G \in \mathfrak{N}$ тогда и только тогда, когда $\chi'(G) = \Delta(G)$.

(2) Если $G \in \mathfrak{N}$ и $\Delta(G) \leq t \leq W(G)$, то G имеет интервальную реберную t -раскраску.

Известно [2], что для любого графа G $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$. В [10] доказано, что для регулярного графа G проблема определения: $\chi'(G) = \Delta(G)$ или $\chi'(G) \neq \Delta(G)$, является NP -полней. Отсюда и из теоремы 3 следует, что для регулярного графа G проблема определения: $G \in \mathfrak{N}$ или $G \notin \mathfrak{N}$, является также NP -полней.

Настоящая работа посвящена исследованию интервальных реберных раскрасок "лестниц Мебиуса". Не определяемые понятия можно найти в [1,3,5,11].

Лемма 1. При $n \geq 2$ $d(M_{2n}) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Доказательство. Пусть $V(M_{2n}) = \{x_1, x_2, \dots, x_{2n}\}$,

$$E(M_{2n}) = \{(x_i, x_{i+1}) \mid 1 \leq i \leq 2n-1\} \cup \{(x_{2n}, x_1)\} \cup \{(x_i, x_{n+i}) \mid 1 \leq i \leq n\}.$$

Ясно, что $d(x_1, x_{n+\lceil \frac{n}{2} \rceil}) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Отсюда следует, что $d(M_{2n}) \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Докажем, что $d(M_{2n}) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Очевидно, для этого достаточно показать, что при $1 \leq i < j \leq 2n$ $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Случай 1. $1 \leq i < j \leq n$.

Покажем, что $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Если $j - i \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$, то $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Пусть теперь $j - i \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1$. Рассмотрим простую цепь

$$P_1 = (x_i, (x_i, x_{i-1}), x_{i-1}, \dots, x_2, (x_2, x_1), x_1, (x_1, x_{2n}), x_{2n}, (x_{2n}, x_n), x_n, (x_n, x_{n-1}), x_{n-1}, \dots, x_{j+1}, (x_{j+1}, x_j), x_j).$$

Легко видеть, что $d(x_i, x_j) \leq i - 1 + 2 + n - j = n + 1 - (j - i) \leq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Случай 2. $n + 1 \leq i < j \leq 2n$.

Покажем, что $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Если $j - i \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$, то $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Пусть теперь $j - i \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1$. Рассмотрим простую цепь

$$P_2 = (x_i, (x_i, x_{i-1}), x_{i-1}, \dots, x_{n+2}, (x_{n+2}, x_{n+1}), x_{n+1}, (x_{n+1}, x_n), x_n, (x_n, x_{2n}), x_{2n}, (x_{2n}, x_{2n-1}), x_{2n-1}, \dots, x_{j+1}, (x_{j+1}, x_j), x_j).$$

Легко видеть, что $d(x_i, x_j) \leq i - n - 1 + 2 + 2n - j = n + 1 - (j - i) \leq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Случай 3. $1 \leq i \leq n$, $n + 1 \leq j \leq 2n$, $n + i \leq j$.

Покажем, что $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Если $j - i - n + 1 \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$, то $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Пусть теперь $j - i - n \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Рассмотрим простую цепь

$$P_3 = (x_i, (x_i, x_{i-1}), x_{i-1}, \dots, x_2, (x_2, x_1), x_1, (x_1, x_{2n}), x_{2n}, (x_{2n}, x_{2n-1}), x_{2n-1}, \dots, x_{j+1}, (x_{j+1}, x_j), x_j)$$

Легко видеть, что $d(x_i, x_j) \leq i - 1 + 1 + 2n - j = 2n - (j - i) \leq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Случай 4. $1 \leq i \leq n$, $n + 1 \leq j \leq 2n$, $n + i \geq j$.

Покажем, что $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Если $n + i - j + 1 \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$, то $d(x_i, x_j) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Пусть теперь $n + i - j \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Рассмотрим простую цепь

$$P_4 = (x_i, (x_i, x_{i+1}), x_{i+1}, \dots, x_{n-1}, (x_{n-1}, x_n), x_n, (x_n, x_{n+1}), x_{n+1}, \dots, x_{j-1}, (x_{j-1}, x_j), x_j).$$

Легко видеть, что $d(x_i, x_j) \leq n - i + 1 + j - n - 1 = j - i \leq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Лемма 1 доказана.

Лемма 2. При $n \geq 2$ $W(M_{2n}) \geq n + 2$.

Доказательство. Пусть $V(M_{2n}) = \{x_1, x_2, \dots, x_{2n}\}$,

$$E(M_{2n}) = \{(x_i, x_{i+1}) \mid 1 \leq i \leq 2n-1\} \cup \{(x_{2n}, x_1)\} \cup \{(x_i, x_{n+i}) \mid 1 \leq i \leq n\}.$$

Определим раскраску α ребер графа M_{2n} .

Случай 1. $n = 2m$, $m \in N$.

Для $i = 1, 2, \dots, m$ положим

$$\alpha((x_{m-1+i}, x_{3m-1+i})) = 2i - 1.$$

Для $i = 1, 2, \dots, m-1$ положим

$$\alpha((x_{m-i}, x_{3m-i})) = 2(i+1).$$

Для $i = 1, 2, \dots, m$ положим

$$\alpha((x_{m-1+i}, x_{m+i})) = \alpha((x_{3m-1+i}, x_{3m+i})) = 2i.$$

Для $i = 1, 2, \dots, m-1$ положим

$$\begin{aligned} \alpha((x_{m-i}, x_{m+1-i})) &= \alpha((x_{3m-i}, x_{3m+1-i})) = 2i + 1 \text{ и} \\ \alpha((x_1, x_{4m})) &= \alpha((x_{2m}, x_{2m+1})) = 2m + 1, \quad \alpha((x_{2m}, x_{4m})) = 2m + 2. \end{aligned}$$

Случай 2. $n = 2m + 1$, $m \in N$.

Для $i = 1, 2, \dots, m+1$ положим

$$\alpha((x_{m+i}, x_{3m+1+i})) = 2i - 1.$$

Для $i = 1, 2, \dots, m-1$ положим

$$\alpha((x_{m+1-i}, x_{3m+2-i})) = 2(i+1).$$

Для $i = 1, 2, \dots, m$ положим

$$\alpha((x_{m+i}, x_{m+1+i})) = \alpha((x_{3m+1+i}, x_{3m+2+i})) = 2i.$$

Для $i = 1, 2, \dots, m$ положим

$$\begin{aligned} \alpha((x_{m+1-i}, x_{m+2-i})) &= \alpha((x_{3m+2-i}, x_{3(m+1)-i})) = 2i + 1 \text{ и} \\ \alpha((x_1, x_{4m+2})) &= \alpha((x_{2m+1}, x_{2m+2})) = 2m + 2, \quad \alpha((x_1, x_{2m+2})) = 2m + 3. \end{aligned}$$

Легко видеть, что α является интервальной реберной $(n+2)$ -раскраской графа M_{2n} при $n \geq 2$.

Лемма 2 доказана.

Теорема 4. При $n \geq 2$

- (1) $M_{2n} \in \mathfrak{N}$,
- (2) $w(M_{2n}) = 3$,
- (3) $W(M_{2n}) = n + 2$,

(4) если $w(M_{2n}) \leq t \leq W(M_{2n})$, то M_{2n} имеет интервальную реберную t -раскраску.

Доказательство. Так как M_{2n} при $n \geq 2$ является регулярным графом, удовлетворяющим равенству $\chi'(M_{2n}) = \Delta(M_{2n}) = 3$, то из теоремы 3 вытекают утверждения (1) и (2) доказываемой теоремы.

Докажем, что при $n \geq 2$ $W(M_{2n}) = n + 2$.

Из леммы 2 следует, что при $n \geq 2$ $W(M_{2n}) \geq n + 2$.

Покажем, что при $n \geq 2$ $W(M_{2n}) \leq n + 2$.

Случай 1. $n = 2m + 1$, $m \in N$.

Так как граф M_{4m+2} является двудольным, то из теоремы 1 и леммы 1 вытекает неравенство $W(M_{4m+2}) \leq 2m + 3$.

Случай 2. $n = 2m$, $m \in N$.

Так как граф M_{4m} содержит цикл нечетной длины, то из теоремы 2 и леммы 1 вытекает неравенство $W(M_{4m}) \leq 2m + 3$.

Покажем, что $W(M_{4m}) \leq 2m + 2$.

Пусть $V(M_{4m}) = \{x_1, x_2, \dots, x_{4m}\}$,

$$E(M_{4m}) = \{(x_i, x_{i+1}) \mid 1 \leq i \leq 4m-1\} \cup \{(x_{4m}, x_1)\} \cup \{(x_i, x_{2m+i}) \mid 1 \leq i \leq 2m\}.$$

Предположим, что α является интервальной реберной $(2m+3)$ -раскраской графа M_{4m} .

Пусть $e \in E(M_{4m})$ и $\alpha(e) = 2m+3$.

Случай 2а). $e \in \{(x_i, x_{i+1}) \mid 1 \leq i \leq 4m-1\} \cup \{(x_{4m}, x_1)\}$.

Без ограничения общности можно считать, что $e = (x_1, x_2)$ и существует вершина x_k , где $2 \leq k \leq 2m+1$, которая инцидентна ребру цвета 1. Рассмотрим простую цепь

$$P_1 = (x_2, (x_2, x_3), x_3, \dots, x_{k-1}, (x_{k-1}, x_k), x_k).$$

Из интервальности раскраски α следует, что $k \geq m+2$. Теперь рассмотрим простую цепь

$$P_2 = (x_k, (x_k, x_{k+1}), x_{k+1}, \dots, x_{2m}, (x_{2m}, x_{2m+1}), x_{2m+1}).$$

Из интервальности раскраски α следует, что $\alpha((x_{2m}, x_{2m+1})) \leq 2m-2$. Так как $\alpha((x_1, x_{2m+1})) \geq 2m+1$, то $\alpha((x_{2m}, x_{2m+1})) \geq 2m-1$, что приводит к противоречию, и доказательство в случае 2а) завершается.

Случай 2б). $e \in \{(x_i, x_{2m+i}) \mid 1 \leq i \leq 2m\}$.

Без ограничения общности можно считать, что $e = (x_1, x_{2m+1})$ и существует вершина x_k , где $2 \leq k \leq 2m+1$, которая инцидентна ребру цвета 1. Рассмотрим простую цепь

$$P_3 = (x_1, (x_1, x_2), x_2, \dots, x_{k-1}, (x_{k-1}, x_k), x_k).$$

Из интервальности раскраски α следует, что $k \geq m+1$. Теперь рассмотрим простую

цепь

$$P_4 = (x_k, (x_k, x_{k+1}), x_{k+1}, \dots, x_{2m}, (x_{2m}, x_{2m+1}), x_{2m+1}).$$

Из интервальности раскраски α следует, что $\alpha((x_{2m}, x_{2m+1})) \leq 2m$. Так как $\alpha((x_1, x_{2m+1})) = 2m + 3$, то $\alpha((x_{2m}, x_{2m+1})) \geq 2m + 1$, что приводит к противоречию, и доказательство в случае 2б) завершается.

Для завершения доказательства теоремы 4 достаточно показать, что если $3 \leq t \leq n + 2$, то M_{2n} имеет интервальную реверную t -раскраску, а это непосредственно следует из теоремы 3.

Теорема 4 доказана.

Литература

1. F. Harary, Graph Theory, Addison-Wesley, Reading, MA, 1969.
2. В.Г.Визинг, Хроматический класс мультиграфа, Кибернетика, 3, 1965, 29-39.
3. А.А. Зыков, Теория конечных графов, Новосибирск: Наука, 1969.
4. А.С. Асретян, Р.Р. Камалян, Интервальные раскраски ребер мультиграфа, Прикладная математика, вып. 5, 1987, 25–34.
5. Р.Р. Камалян, Интервальные реберные раскраски графов, кан. дисс., ИМ СО АН СССР, Новосибирск, 1990.
6. С.В. Севастьянов, Об интервальной раскрашиваемости ребер двудольного графа, Методы дискретного анализа в решении экстремальных задач, вып. 50, ИМ СО АН СССР, Новосибирск, 1990, 61–72.
7. S. Cook, The complexity of theorem-proving procedures. In Proc. 3rd ACM Symp. on Theory of Computing, 151-158, 1971.
8. R.M. Karp, Reducibility among Combinatorial Problems, in “Complexity of Computer Computations” (R.E. Miller and J.W. Thatcher, Eds.), pp. 85-103, New York, Plenum, 1972.
9. A.S. Asratian, R.R. Kamalian, Investigation on interval edge colorings of graphs, J. Combin. Theory Ser. B 62 (1994) 34-43.
10. I. Holyer, The NP-completeness of edge coloring, SIAM J. Comput. 10, N4 (1981), 718-720.
11. D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.